



VIEJO VIENTO

AGROMETEOROLOGÍA PARA EL CAMPO


BOLETÍN N.º 1 MARTES 4 DE AGOSTO DE 2026
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRÓXIMA EDICIÓN: 11/8

LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

El sudeste bonaerense es el nudo de la campaña: la siembra de trigo se frenó a 1,6 puntos del final y todavía falta cosechar el 30 % del maíz, en los dos casos por exceso de agua. Y el trimestre que viene pinta más húmedo, no menos.

AVANCE DE CAMPAÑA

RELEVAMIENTO AL 30/07



FUENTE

Bolsa de Cereales de Buenos Aires · Panorama Agrícola Semanal · publicado el jueves 30/07/2026

TRIGO

26/27 · SIEMBRA

La siembra llegó al 98,4 % de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas, pero avanzó apenas 0,7 puntos porcentuales en la última semana. El freno es puntual y conocido: exceso de humedad en el sur bonaerense, con el sudeste como el punto más comprometido. La Bolsa de Cereales advierte que hay lotes que podrían abandonarse si el panorama no mejora. En el resto del área, el cereal en pie está en condición normal a excelente en el 99,7 % de la superficie.

MAÍZ

25/26 · COSECHA

Todavía resta cosechar el 30 % de los lotes, cuando a esta altura la trilla debería estar terminando. El rinde promedio es de 79,4 qq/ha y la proyección se sostiene en 64 millones de toneladas. El cuello de botella vuelve a ser el sudeste: la humedad ambiente alta no deja secar el grano. En el norte, además, los relevamientos sanitarios registran una incidencia de chicharrita (*Dalbulus maidis*) mayor a la prevista, y su impacto sobre el rinde recién va a verse a medida que avance la cosecha.

GIRASOL

26/27 · SIEMBRA

Arrancó la siembra, con 3 millones de hectáreas proyectadas —un 5,3 % más que el ciclo anterior y la mayor superficie del siglo— y un 4,4 % de avance nacional concentrado por completo en el NEA, donde ya se implantó el 23,6 % del área regional. En el centro del área agrícola las labores esperan que suban las temperaturas. En el sur todavía falta para la ventana, pero la condición actual de los lotes y la perspectiva de año húmedo ya están metiendo ruido en la planificación.

SORGO

25/26 · COSECHA

90,3 % cosechado, 41,4 qq/ha de promedio nacional, con el Centro-Norte de Córdoba arriba de todos en 56,5 qq/ha. La proyección se recortó en 100.000 toneladas, a 2,8 millones.

EL ESCENARIO DE FONDO

EL NIÑO

81 %

PROBABILIDAD DE EL NIÑO MUY FUERTE EN OCTUBRE-DICIEMBRE

97 %

PROBABILIDAD DE QUE SE EXTIENDA HASTA COMIENZOS DE 2027

+1,2

ÍNDICE NIÑO-3.4, EN GRADOS CENTÍGRADOS

Estamos en fase cálida del ENSO y va a seguir así. De confirmarse la intensidad que proyectan los modelos, el evento quedaría entre los más grandes del registro desde 1950.

El pronóstico trimestral del SMN para agosto-septiembre-octubre lo traduce al mapa: precipitación **superior a la normal** en La Pampa y sudoeste de Buenos Aires; **normal o superior a la normal** en el este de la provincia; temperatura media **normal** en todo el territorio bonaerense.

Como antecedente inmediato, entre el viernes 31 y el sábado 1 las lluvias llegaron a superar los 100 mm en puntos de la franja este del país, y varias estaciones del área metropolitana marcaron récords de precipitación para el mes de julio.

FUENTES

NOAA / Climate Prediction Center · discusión ENSO del 09/07/2026 · Servicio Meteorológico Nacional · trimestral ago-sep-oct 2026 y registros de julio

Este número no lleva pronóstico a siete días: al cierre no pudimos verificar los valores diarios contra fuente oficial. Lo que sigue son criterios para aplicar cuando aparezca la ventana. Mirarlos contra el pronóstico extendido del SMN para el partido de cada uno.

MAÍZ

COSECHA EN EL SUDESTE

Cuando entre aire posfrontal seco, lo que baja la humedad del grano es la caída de la humedad relativa, no la temperatura. Con máximas de invierno el secado a campo es lento y solo rinde en el bloque del mediodía a la media tarde. No conviene planificar sobre la expectativa de bajar varios puntos de humedad por día.

Si hay secadora disponible, la estrategia es trillar con humedad de recibo apenas haya piso y terminar de secar en planta, en lugar de esperar a que el lote se seque solo.

PISO

LA CAPA QUE ENGAÑA

Unos días sin lluvia firman la superficie, no drenan el perfil. En lotes saturados va a haber una capa superficial que aguanta el primer paso y cede después. Antes de meter equipo pesado, revisar a 20-30 cm.

TRIGO

CIERRE DE SIEMBRA

Queda cerca del 1,6 % del área nacional, buena parte en el sudeste. La ventana para ciclos cortos se está cerrando y una siembra forzada sobre un lote sin piso arranca con dos problemas encima. Con la perspectiva de primavera húmeda, vale hacer el número de reasignar ese lote a un cultivo de gruesa antes que salvar la intención de siembra.

PULVERIZACIÓN

LA INVERSIÓN NO LA MIDE EL DELTA T

Las noches despejadas con mínimas cercanas a cero arman inversión térmica marcada y persistente. Se corta un par de horas después de la salida del sol y se rearma antes del atardecer, así que la ventana útil es el bloque central del día. El horario exacto depende del lugar y del día: la inversión se verifica a campo, con humo o con dos sensores a distinta altura, no con el reloj.

El detalle de invierno que suele pasarse por alto: con temperaturas bajas y humedad alta el Delta T suele quedar por debajo de 2, lo que da poca evaporación de gota y puede leerse como condición ideal. No lo es. En esta época el riesgo de deriva no viene de la evaporación sino de la inversión, y el Delta T no la mide.

GANADERÍA

HELADAS Y VERDEOS

Las mínimas que publica el SMN son de abrigo, a 1,5 m. A nivel de canopeo pueden ser 2 a 4 °C más bajas, así que hay heladas agronómicas con mínimas de abrigo todavía positivas. El trigo en macollaje lo tolera sin problema. Donde pega es en los verdeos de invierno: varios días de heladas consecutivas cortan el rebrote, y conviene ajustar la carga o adelantar el suplemento en lugar de esperar a que la pastura responda.

OCTUBRE

FUSARIOSIS, SE DECIDE AHORA

Con una primavera que pinta húmeda, el trigo va a florecer en condiciones de alto riesgo de fusariosis de espiga. La decisión no es en octubre: presupuestar el fungicida y tener el equipo disponible para aplicar en floración, que es una ventana de días, no de semanas.

- 01 **El trimestral no dice cuánta lluvia va a caer.** Lo que dice es si el total acumulado de los tres meses va a quedar por encima, cerca o por debajo del promedio histórico de esa zona. No dice qué día llueve, ni cuánto cae en cada evento, ni si en el medio va a haber tres semanas secas. Un año Niño puede cerrar con acumulados por encima de lo normal y aun así tener un octubre seco.
- 02 **La intensidad de El Niño se está definiendo.** El 81 % corresponde a la discusión del 9 de julio del CPC. La próxima sale el 13 de agosto y puede mover el número en cualquier dirección.
- 03 **Los datos de campaña son de relevamiento, no de medición.** El Panorama Agrícola Semanal se construye con colaboradores a campo y se corrige semana a semana. Las proyecciones de producción, en particular, se mueven.
- 04 **Por qué no hay pronóstico semanal.** No pudimos verificar contra fuente oficial los valores diarios de temperatura y lluvia al cierre de esta edición, y preferimos no publicarlos. Para los próximos siete días, el pronóstico extendido del SMN por localidad.

FUENTES

CONSULTADAS EL 04/08/2026

Bolsa de Cereales de Buenos Aires – Panorama Agrícola Semanal, publicado el jueves 30 de julio de 2026. El PAS se difunde los jueves a las 15 h.

Servicio Meteorológico Nacional – Pronóstico Climático Trimestral agosto-septiembre-octubre 2026 y registros de precipitación de julio.

NOAA / Climate Prediction Center – ENSO Diagnostic Discussion del 9 de julio de 2026. Próxima edición: 13 de agosto.