



VIEJO VIENTO

AGROMETEOROLOGÍA PARA EL PRODUCTOR

BOLETÍN N.º 3 LUNES 17 DE AGOSTO DE 2026

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRÓXIMA EDICIÓN: 24/8

INSTAGRAM: VIEJO VIENTO MAIL: ELVIEJOVIENTO@GMAIL.COM

SUDESTE · CENTRO · CUENCA DEL SALADO · NORTE BONAERENSE

LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

El Niño 2026 se perfila como uno de los más intensos del registro: la NOAA elevó al 95 % la probabilidad de evento muy fuerte en octubre-diciembre. Semana de cielo cubierto, humedad persistente y heladas que alcanzaron al trigo en estadios vegetativos sin comprometer el ápice. Maíz con 23 % del área pendiente: las ventanas de cosecha se acortan.

EL NIÑO 2026

ACTUALIZACIÓN CPC 13/08

El Centro de Predicción Climática de la NOAA elevó al **95 %** la probabilidad de que El Niño alcance intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026. La anomalía semanal en la región Niño 3.4 tocó **+1,8 °C**, un nivel que en el Super El Niño 1997-98 no se alcanzó hasta el 20 de agosto. Desde julio, la probabilidad de evento muy fuerte creció ~14 puntos porcentuales. Sin embargo, la clasificación definitiva se determina por promedios trimestrales, no por registros semanales aislados.

95 %

PROBABILIDAD DE EL NIÑO
MUY FUERTE EN OCT-DIC

97 %

PROBABILIDAD DE QUE SE
EXTIENDA HASTA 2027

+1,8

ANOMALÍA NIÑO-3.4
EN GRADOS CENTÍGRADOS

Qué significa para Buenos Aires: un Niño muy fuerte en primavera-verano se asocia a precipitaciones por encima de lo normal en la pampa húmeda, con mayor frecuencia de tormentas severas y riesgo de anegamiento en la Cuenca del Salado y el sudeste. El trimestral ASO 2026 del SMN prevé lluvias normales o superiores y temperaturas medias con mayor probabilidad de estar por encima de lo habitual.

FUENTE

CPC/NOAA – Disc. Diagnóstica ENSO, 13/08/2026 · Meteored / Agrolatam, 13-14/08/2026 · SMN – Pronóstico Climático Trimestral ASO 2026.

CLIMA OBSERVADO

SEMANA DEL 11 AL 17/08

Buenos Aires acumuló varias semanas consecutivas con cielo cubierto, humedad persistente y escasa insolación, originadas en el dominio sostenido de un anticiclón del Atlántico que inyectó humedad en capas bajas, favoreciendo nubes estratiformes y lloviznas intermitentes. Las heladas más significativas del mes se concentraron entre el 7 y el 10 de agosto. En la región pampeana, la marca más baja fue **-5,1 °C en Olavarría**. En Buenos Aires, las mínimas oscilaron entre -2 °C y +4 °C según la subregión, con heladas agronómicas en gran parte del sudeste y centro.

FUENTE

SMN / Canal 26, 16/08/2026 · ORA – Boletín Semanal de Precipitación y Temperatura.

HELADAS Y TRIGO

DIAGNÓSTICO

Las heladas de la primera quincena alcanzaron al trigo en estadios vegetativos (expansión foliar a macollaje). Los síntomas visibles —puntas secas, bandeo clorótico, necrosis de tejido— fueron reportados en múltiples zonas. Sin embargo, el meristema apical permanece protegido bajo la superficie del suelo, limitando el daño funcional. La bibliografía del INTA y GDM coinciden en que la capacidad de compensación en macollaje es alta y el impacto sobre rendimiento suele ser bajo.

Nota: los lotes en encañazón temprana (región núcleo, hacia el 15/08) presentan mayor vulnerabilidad. En el sudeste bonaerense, la ventana crítica arranca en septiembre.

FUENTE
INTA / GDM-Neogen, julio 2026.

PERSPECTIVA

SEMANA DEL 18 AL 23/08

PRONÓSTICO SMN PARA EL AMBA Y CENTRO-ESTE BONAERENSE

Martes 18: tiempo inestable, posibilidad de lluvias, 9 a 12 °C. **Miércoles 19:** mejora parcial, algo de sol entre nubosidad. **Jueves a viernes:** leve aumento de temperaturas. **Fin de semana:** nuevo descenso, mínimas cerca de 5 °C y máximas ≤12 °C.

FUENTE
SMN / Noticias Argentinas, 17/08/2026.

AVANCE DE CAMPAÑA

RELEVAMIENTO AL 14/08



TRIGO

26/27 · SIEMBRA

Siembra: **99,6 %** de 6,5 M ha. Condición: 100 % normal a excelente. Prácticamente cerrada a nivel nacional. La superficie pendiente se concentra en el sur, donde los excesos hídricos frenaron el ingreso de maquinaria en julio. El cultivo transita desde expansión foliar hasta macollaje; en la zona núcleo hay reportes de encañazón temprana. Condición hídrica adecuada a óptima en la totalidad del área implantada.

MAÍZ

25/26 · COSECHA DEMORADA

Cosecha: **77 %** del área apta. Rinde: 78,6 qq/ha. Proyección: 64 M tn. El atraso acumula 14 a 26 pp respecto de la media de los últimos cinco años. La humedad relativa persistente impidió el secado natural del grano en pie. Se sumaron vientos de hasta 100 km/h en Córdoba con vuelcos en lotes tardíos. Los rindes sostienen la proyección en 64 M tn. La semana pasada, el viento ayudó a secar lotes y caminos, reactivando la trilla en varias zonas.

GIRASOL

26/27 · SIEMBRA

Siembra: **11,5 %** de 3 M ha (+4,6 pp vs promedio 5 campañas). Superficie proyectada: 3 M ha, la mayor del presente siglo (+5,3 % interanual). En el centro del área agrícola el inicio espera temperaturas más altas; en el sur, la saturación de suelos y la perspectiva de año húmedo generan incertidumbre.

SORGO

25/26 · COSECHA

Cosecha: **97,9 %**. Rinde: 40,8 qq/ha. Proyección: 2,8 M tn.

FUENTE
Bolsa de Cereales de Buenos Aires – PAS, relevamiento del 14/08/2026 · La Nación, 11-14/08/2026.

PRECIOS DE REFERENCIA

CIERRE DE LA SEMANA

GRANO	PIZARRA (\$/TN)	USD/TN	VAR. SEM.
Trigo	326.260	220	estable
Maíz	267.050	180	+0,4 %
Soja	507.000	342	+0,3 %
Sorgo	277.321	187	+1,1 %
Girasol	–	~520 (est.)	s/c

Valores del 15/08/2026. Pizarra Rosario: BCCBA / Infocampo. USD al TC BNA comprador. Trigo Bahía Blanca: USD 210–230 (Granar). Girasol estimado Bahía Blanca.

FUENTE
BCCBA / Infocampo / Granar, 14-15/08/2026.

DECISIONES

CRITERIOS DE MANEJO

TRIGO

MONITOREO POST-HELADA

No apurarse a diagnosticar por el aspecto visual. Esperar 7–10 días después de la última helada para evaluar la recuperación del ápice. En lotes que arrancan a encañar, revisar la integridad del futuro primordio floral con lupa. Si el meristema está intacto, el cultivo compensa. Si hay daño en el primordio, evaluar la proporción de macollos afectados antes de tomar decisiones de resiembra o abandono.

MAÍZ

VENTANA DE COSECHA

Con ~23 % del área apta todavía pendiente, las próximas semanas son críticas. El pronóstico indica lluvias el martes 18 y un nuevo enfriamiento hacia el fin de semana. Quien tenga lotes secos debería priorizar la cosecha en las ventanas del miércoles a viernes (19–21). El costo de secado artificial sigue siendo inferior al riesgo de vuelco por viento, que ya causó pérdidas en Córdoba y podría repetirse.

GIRASOL

PLANIFICACIÓN BAJO ESCENARIO NIÑO

Con 95 % de probabilidad de Niño muy fuerte, los lotes del sur de Buenos Aires con baja capacidad de drenaje concentran riesgo de anegamiento. El PAS ya señala incertidumbre en el sudeste bonaerense para la planificación de girasol. Evaluar la posición topográfica de cada lote, la historia de encharcamiento y la fecha de apertura de la ventana de siembra antes de confirmar superficies.

FUENTES

CONSULTADAS EL 17/08/2026

Bolsa de Cereales de Buenos Aires — Panorama Agrícola Semanal, 14/08/2026. · **ORA / SAGyP** — Boletín Semanal de Precipitación y Temperatura. · **SMN** — Pronóstico Climático Trimestral ASO 2026; avisos del 17/08. · **NOAA / CPC** — ENSO Diagnostic Discussion, 13/08/2026. · **INTA / GDM-Neogen** — Análisis de daño por heladas en trigo, julio 2026. · **BCCBA / Infocampo / Granar** — Precios de pizarra, 14-15/08/2026. · **Meteored / La Nación** — Cobertura periodística, 11-17/08/2026.



VIEJO VIENTO · AGROMETEOROLOGÍA PARA EL PRODUCTOR

Instagram: **viejo viento** · Mail: **elviejoviento@gmail.com**

Boletín N.º 3 · cierre de edición 17/08/2026 · próxima edición 24/08/2026

Dato sin fuente no se publica. Dato observado y dato pronosticado se distinguen siempre. Las lagunas se declaran, no se estiman.