

EL VIEJO VIENTO

Agrometeorología para el productor



Boletín semanal N.º 5 · Lunes 31 de agosto de 2026

Sudeste · Centro · Cuenca del Salado · Norte bonaerense

Próxima edición:
7/9/2026

Lo que importa esta semana

- Un solo evento de lluvia y llega el miércoles 2/9.** Es el día con mayor probabilidad de precipitación de los próximos siete (75 % en Balcarce, 55 % en Tandil, 30 % en Azul). El resto de la semana se presenta seco: si hay una ventana para pulverizar, refertilizar o entrar a lote, está entre el jueves 3 y el viernes 4.
- Irrupción de aire frío del sábado 5 al lunes 7: tres mañanas seguidas con riesgo de helada.** Las mínimas de abrigo proyectadas caen a 1,6 / 0,2 / -0,3 °C (Balcarce, Tandil, Azul) el sábado y se mantienen en torno a 0 °C domingo y lunes. A nivel de suelo eso significa helada agrometeorológica muy probable en las tres subregiones del centro y sudeste.
- El trigo está bien parado para recibir ese frío.** Con el 90,8 % del área nacional en condición hídrica adecuada u óptima y el 76,4 % del cultivo de macollaje en adelante, el estado fenológico dominante todavía tolera helada. El riesgo no está en el trigo: está en verdeos recién pastoreados, pasturas nuevas, girasol de zonas primicia y frutales.
- El Niño se sigue fortaleciendo.** El CPC/NOAA mantiene el aviso de El Niño y ubica por encima del 90 % la probabilidad de un evento *muy fuerte* hacia el trimestre octubre-diciembre. Lo que se decida en septiembre (fecha de siembra de gruesa, carga animal, reservas) conviene pensarlo contra ese escenario, no contra un año promedio.

Pronóstico a 7 días

DÍA	BALCARCE			TANDIL			AZUL		
	MÁX	MÍN	PROB.	MÁX	MÍN	PROB.	MÁX	MÍN	PROB.
Lun 31/8	18,3	3,2	10 %	17,9	3,5	10 %	18,9	3,4	15 %
Mar 1/9	17,3	2,8	10 %	17,3	3,2	10 %	18,9	3,0	10 %
Mié 2/9	13,8	6,6	75 %	14,9	6,6	55 %	18,1	7,7	30 %
Jue 3/9	12,9	2,6	5 %	13,6	2,6	0 %	16,1	1,6	0 %
Vie 4/9	14,1	2,6	10 %	14,4	2,6	10 %	16,5	1,4	0 %
Sáb 5/9	7,5	1,6	15 %	7,7	0,2	15 %	10,0	-0,3	10 %
Dom 6/9	10,3	0,6	10 %	10,1	0,2	10 %	11,3	-0,3	10 %
Lun 7/9	13,6	0,7	10 %	13,4	0,5	10 %	14,9	0,0	5 %

Temperaturas en °C, en abrigo meteorológico (1,5 m). «Prob.» es probabilidad de precipitación. Pronóstico orientativo de modelo global determinístico, emitido el 31/8/2026 por la mañana; al cierre de esta edición no pudo cotejarse contra el pronóstico oficial del SMN.

Lectura agrometeorológica del frío. A nivel de césped la temperatura suele ubicarse entre 2 y 4 °C por debajo del abrigo en noches despejadas, con viento calmo y suelo seco en superficie — las condiciones esperables tras el pasaje frontal del miércoles. Con mínimas de abrigo entre -0,3 y 1,6 °C, la helada a nivel de suelo pasa de posible a **esperable las mañanas del 5, 6 y 7 de septiembre**, con la del domingo 6 como la más probable. Zonas bajas, bordes de laguna y lotes con rastrojo abundante van a marcar los valores más bajos del establecimiento.

Avance de campaña

6,5 M HA DE TRIGO SIEMBRA FINALIZADA	90,8 % DEL TRIGO EN CONDICIÓN HÍDRICA ADECUADA/ÓPTIMA	88 % DEL MAÍZ 25/26 COSECHADO	16,7 % DEL GIRASOL 26/27 IMPLANTADO
---	--	--	--

TRIGO 2026/27 — SIEMBRA CERRADA, CONDICIÓN EN FRANCA MEJORA

La Bolsa de Cereales dio por finalizada la siembra de trigo sobre las 6,5 millones de hectáreas proyectadas; quedan lotes aislados sin implantar en el sur del área agrícola que no modifican la estimación. La lectura fina es que la falta de piso durante la ventana de siembra impidió ampliar el área: no fue una decisión de mercado, fue el suelo. Hoy el 90,8 % del área presenta condición hídrica adecuada u óptima y el 76,4 % del cereal está de macollaje en adelante.



TRIGO — QUÉ SIGNIFICA PARA NUESTRA ZONA

Qué significa para el centro y sudeste bonaerense: el cultivo llega al arranque de septiembre con perfil cargado y en un estadio que todavía protege el ápice de crecimiento. La ventana crítica de helada para nuestra zona no es esta semana — es la de encañazón a espigazón, entre fines de septiembre y octubre. Es el momento de anotar la fecha estimada de espigazón por lote, porque de ahí en adelante cada helada cambia de categoría.

GIRASOL 2026/27 — ADELANTADO RESPECTO DE LOS PROMEDIOS

La implantación llegó al 16,7 % de las 3 millones de hectáreas proyectadas, con un avance intersemanal de 2,6 puntos. Va 3,8 puntos por encima del promedio de las últimas cinco campañas y 5,4 puntos por encima del promedio histórico, pese a que las lluvias en el NEA frenaron las labores. En el sur del área agrícola la recuperación de humedad superficial empieza a mejorar las condiciones para la próxima ventana de siembra. Los lotes ya emergidos son los que hay que mirar el fin de semana: un girasol en emergencia o primeras hojas es sensible a helada de suelo.

MAÍZ 2025/26 — LA COSECHA RECUPERA RITMO PERO SIGUE ATRASADA ACÁ

El maíz alcanzó el 88 % del área apta a nivel nacional con un rendimiento promedio de 78 qq/ha y un progreso semanal de 6,7 puntos, gracias a condiciones ambientales favorables que permitieron entrar a lotes demorados por humedad. Aun así, la cosecha acumula un retraso de 9,2 puntos porcentuales contra la campaña anterior, y **los principales remanentes están justamente en el sudoeste bonaerense-sur de La Pampa y en el sudeste bonaerense**. La proyección nacional se sostiene en 64 millones de toneladas.

Para quien todavía tiene maíz en pie en el sudeste: la semana ofrece piso razonable de jueves a lunes, con lluvia acotada al miércoles. Es la ventana más limpia que se ve en el horizonte de siete días.

SORGO 2025/26 — CERRADO CON BUEN NÚMERO

Cosecha finalizada a nivel nacional, con un rinde promedio de 40,7 qq/ha contra 35,4 qq/ha del promedio de las últimas cinco campañas, y una producción estimada en 2,8 millones de toneladas. Los mejores registros vinieron del centro-norte de Córdoba (56,5 qq/ha), Núcleo Sur (53,9) y Núcleo Norte (53,3).

Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Panorama Agrícola Semanal del 27/8/2026 (datos difundidos el 29/8/2026). Los valores son nacionales o por región del relevamiento de la entidad; no corresponden a estimaciones propias por partido.

RESERVAS DE AGUA EN EL SUELO

La condición hídrica del trigo relevada por la Bolsa (90,8 % adecuada u óptima) es consistente con perfiles bien cargados en el centro y sudeste bonaerense. Al cierre de esta edición no pudimos verificar los valores puntuales de porcentaje de agua útil por estación del boletín semanal de la ORA, de modo que **no publicamos cifras de reserva por localidad**. La lectura cualitativa que sí sostenemos: la limitante de las próximas semanas en nuestra zona no aparenta ser el agua disponible sino la temperatura y, en los partidos con historial reciente de excesos, el piso.

La columna del viejo — leer una helada antes de que ocurra

Helada de radiación

Es la de esta semana. Ocurre con cielo despejado, viento calmo y aire seco: el suelo pierde calor por emisión hacia la atmósfera y enfría la capa de aire que tiene encima. Por eso el aire más frío queda **abajo**, el daño empieza a nivel de suelo y las zonas bajas del campo son las primeras en marcar. Se puede combatir: mover el aire, mojar el suelo antes, mantener el lote firme y sin rastrojo suelto.

Helada advectiva

Llega con una masa de aire frío que entra con viento sostenido, muchas veces con cielo cubierto. Enfría toda la columna de aire por igual, no solo la capa baja. No respeta la topografía y no hay defensa práctica a campo. Es menos frecuente acá pero más severa. La diferencia se reconoce en el pronóstico: si hay viento y nubes, no esperes que la loma te salve.

Regla práctica para el fin de semana: si el sábado a la noche el cielo está despejado y las hojas no se mueven, la mínima de tu lote va a estar por debajo de la que anuncia cualquier pronóstico. Ese es el momento de mirar el termómetro propio, no el pronóstico.

Estado actual

- Sistema de alerta del CPC/NOAA: **Aviso de El Niño** (El Niño Advisory) vigente.
- Diagnóstico del 13/8/2026: El Niño se fortaleció durante el último mes, con señales cada vez más claras en el acoplamiento océano-atmósfera.
- Probabilidad de evento **muy fuerte** (anomalía superior a 2 °C) durante el trimestre octubre-diciembre: **superior al 90 %**, elevada respecto de la actualización de julio.
- La anomalía semanal relativa de TSM en la región Niño 3.4 alcanzó 1,8 °C, un registro inusualmente temprano en la serie del CPC.

Qué implica para Buenos Aires

- El Niño inclina — no garantiza — la probabilidad de **precipitaciones por encima de lo normal** en la región pampeana durante primavera y comienzo del verano.
- Los eventos fuertes suelen alcanzar su máxima intensidad entre la primavera y el inicio del verano del hemisferio sur: la ventana octubre-diciembre es la determinante.
- En partidos con excesos hídricos recientes, un El Niño intenso agrega riesgo de **anegamiento** sobre suelos ya cargados, más que de sequía.
- Contracara menos comentada: primaveras Niño tienden a mayor nubosidad, lo que **reduce la frecuencia de heladas de radiación** tardías, aunque no las elimina.

Fuente: NOAA/Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion de agosto de 2026 (actualización del 13/8/2026). El desarrollo por subregión bonaerense está tratado en nuestro informe técnico «El Niño 2026/27: impacto esperado sobre la agricultura y la ganadería bonaerense» (cierre de datos 11/8/2026).

Mercados y hacienda

Al cierre de esta edición **no pudimos verificar contra fuente primaria las cotizaciones de la rueda del viernes 28/8** para trigo, maíz y hacienda. Fieles al criterio del boletín, no publicamos números que no podamos citar. Lo que sí se puede afirmar del contexto de las últimas semanas:

- **Trigo.** El mercado internacional viene sostenido por la prima de riesgo geopolítica en el Mar Negro, que durante agosto empujó los futuros a los valores más altos en tres años, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Con la siembra local ya cerrada y una condición de cultivo mejor que la del arranque de campaña, la variable que manda el resultado ahora es el rinde, no el área.
- **Maíz.** El remanente de cosecha 25/26 concentrado en el sur bonaerense sigue presionando la logística local; la proyección nacional firme en 64 Mt limita el margen de sorpresa alcista por oferta doméstica.
- **Insumos.** El costo de fertilizantes nitrogenados sigue siendo el condicionante central del planteo de fina, tal como venía marcando la Bolsa desde el informe de pre-campaña. Cualquier decisión de refertilización de esta semana conviene evaluarla contra relación insumo/producto actualizada, no contra la del arranque de campaña.

Emergencia agropecuaria

El último acto administrativo que pudimos verificar es la **Resolución 216/2026** del Ministerio de Economía, que declaró y prorrogó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en zonas de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, Roque Pérez, Coronel Suárez, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco, con fechas de finalización del ciclo productivo fijadas al 28 de febrero o al 30 de abril de 2026 según la zona.

Esas ventanas ya vencieron. No pudimos verificar declaraciones o prórrogas posteriores vigentes a la fecha de este boletín. El productor de un partido alcanzado que necesite el certificado para acceder a los beneficios de la Ley 26.509 debería consultarlo directamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, que es el organismo que emite el certificado. Vamos a confirmar el estado actual para la próxima edición.



Ganadería

- Las tres mañanas frías (5, 6 y 7/9) frenan el rebrote de verdeos y pasturas. **Si venía pastoreando ajustado, aflojar la carga sobre los lotes recién comidos:** la recuperación de esta semana va a ser más lenta que la de la anterior.
- Revisar aguadas y bebederos el viernes: con mínimas en torno a 0 °C hay congelamiento superficial posible en cañerías expuestas y bebederos de poco volumen.
- Vacas de parición temprana y terneros recién nacidos: el riesgo real del fin de semana no es la temperatura sola sino la combinación con viento y suelo húmedo tras la lluvia del miércoles. Reparo disponible antes del sábado.
- La ventana seca de jueves a lunes ofrece piso para mover y pesar hacienda.

Agricultura

- **Ventana de trabajo: jueves 3 y viernes 4.** Es el bloque más seco y sin viento frío del período. Todo lo que requiera piso o pulverización va ahí.
- No aplicar herbicidas hormonales ni productos con actividad dependiente de temperatura el sábado o domingo: con mínimas cercanas a 0 °C y máximas de 7 a 10 °C, la eficacia cae y el riesgo de fitotoxicidad sube.
- Refertilización nitrogenada de trigo: la lluvia del miércoles es la que incorpora. Aplicar antes del evento tiene más sentido agronómico que después, siempre que el piso lo permita.
- Lotes de girasol emergidos en zonas primicia: recorrer el lunes 7 por la mañana y evaluar daño de helada antes de decidir resiembra. No decidir sobre el estado aparente del día de la helada.
- Maíz en pie en el sudeste: priorizar cosecha en la ventana seca; el frío no daña pero la próxima ventana no está asegurada.

Registro que vale la pena tomar. Si tenés termómetro de mínima, colocá uno a nivel de suelo (5 cm) además del de abrigo durante el fin de semana. La diferencia entre ambos en tu campo es el dato que ninguna fuente pública te va a dar, y es el que traduce cualquier pronóstico de helada a tu lote concreto. Con tres o cuatro noches medidas ya tenés el desfase propio del establecimiento.

Fuentes de esta edición

- **Bolsa de Cereales de Buenos Aires** — Panorama Agrícola Semanal, relevamiento del 27/8/2026.
- **NOAA / Climate Prediction Center** — ENSO Diagnostic Discussion, actualización del 13/8/2026.
- **Ministerio de Economía de la Nación** — Resolución 216/2026 (emergencia y desastre agropecuario, provincia de Buenos Aires).
- **Bolsa de Comercio de Rosario** — comentarios de mercado de granos, agosto de 2026.
- **Modelo global determinístico** — pronóstico a 7 días para Balcarce, Tandil y Azul, emisión del 31/8/2026.

«Donde la helada se mide, la decisión se anticipa.»

El Viejo Viento — Agrometeorología para el productor. Boletín semanal gratuito. Alcance: provincia de Buenos Aires, con foco en el centro y el sudeste bonaerense. Sintetiza fuentes públicas y no reemplaza el asesoramiento profesional sobre cada establecimiento; las decisiones de manejo son responsabilidad del productor.