



BOLETÍN

AGROMETEOROLÓGICO N.º 6

Lunes 7 de septiembre de 2026 · Provincia de Buenos Aires: sudeste, centro, cuenca del Salado y norte
Cierre de datos: 7/9/2026, 09:00 h



“Donde la helada se mide, la decisión se anticipa.”

EL CLIMA QUE IMPORTA PARA EL CAMPO

LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

3 SEÑALES PARA DECIDIR

1

Irrupción polar y heladas fuertes sobre trigo en encañazón y espigazón

El fin de semana ingresó una masa de aire polar que cubrió casi todo el país. El SMN la había anticipado como una irrupción muy destacada, con nevadas en las sierras de Tandil y de La Ventana durante el sábado. Este lunes rige alerta amarilla por frío extremo sobre gran parte del territorio bonaerense. Meteored ubicó las anomalías térmicas entre 7 y 11 °C por debajo de los valores habituales para la fecha. En el centro y sudeste las mínimas de esta madrugada se ubicaron en torno a -2 °C. El dato agronómico relevante no es el frío en sí sino el momento del cultivo: el propio informe semanal de la Bolsa de Cereales señaló que el ascenso térmico de las dos semanas previas elevó en más de 10 puntos porcentuales el área de trigo que transita encañazón y espigazón. Es decir, la helada encontró a una porción creciente de los lotes en la etapa de mayor sensibilidad del ciclo.

2

Ventana térmica favorable de miércoles a jueves, y una segunda helada el fin de semana

Los modelos globales resuelven un ascenso marcado entre el martes y el jueves, con máximas de 20 a 21,6 °C en el centro y sudeste, sin lluvias significativas. Hacia el viernes vuelve a ingresar aire frío y el sábado 12 y domingo 13 aparecen nuevamente mínimas en torno a 0 / -1 °C. Queda entonces una ventana operativa de tres días con piso y temperatura, entre dos episodios de frío.

3

Precios de granos en máximos y ganadería con señales de retención

El trigo tocó USD 288 por tonelada en Chicago, un máximo de tres años, y los futuros de trigo 2026/27 en A3 alcanzaron máximos para la posición diciembre. En paralelo, Rosgan detecta indicios firmes de retención de hembras en los rodeos de cría. Ambas señales inciden sobre decisiones que se toman en las próximas cuatro a seis semanas.

PRONÓSTICO A 7 DÍAS - CENTRO Y SUDESTE BONAERENSE

MÍNIMA / MÁXIMA °C

Localidad	Lun 7	Mar 8	Mié 9	Jue 10	Vie 11	Sáb 12	Dom 13
Tandil	-1,9 / 10,0	2,4 / 16,8	5,8 / 20,2	6,5 / 19,9	2,9 / 13,0	-0,8 / 8,1	-0,6 / 11,1
Azul	-2,0 / 11,7	2,9 / 18,7	4,7 / 20,8	6,7 / 21,6	3,8 / 15,2	-0,3 / 10,4	-0,2 / 12,3
Benito Juárez	-2,2 / 10,8	3,2 / 18,0	5,2 / 21,3	4,9 / 20,6	2,9 / 12,2	-1,1 / 8,3	-1,0 / 12,0
Balcarce	0,5 / 10,4	2,7 / 16,7	5,7 / 21,5	5,5 / 19,6	3,9 / 12,5	0,4 / 7,4	0,5 / 11,4

Mínima / máxima en °C. Probabilidad de precipitación ≤ 15 % todos los días del período; sin acumulados relevantes previstos. Fuente: modelo global de pronóstico consultado el 7/9/2026 a las 09:00 h. Estos valores no fueron cotejados contra el pronóstico oficial del SMN al cierre de esta edición: ver “Incertidumbre declarada”, página 4.

Lectura agronómica del cuadro

Dos episodios de helada agronómica separados por cuatro días templados. La ventana de piso seco y temperatura útil para aplicaciones y laboreo es miércoles 9 y jueves 10. El viernes empieza el deterioro. Las mínimas del sábado y domingo son menos severas que las de hoy, pero encuentran al cultivo con el tejido ya comprometido por el primer evento, lo que importa para lotes que hoy resultaron dañados.

Cultivo	Dato	Situación
Trigo 2026/27	6,5 MHa	Siembra finalizada. El ascenso térmico de las dos semanas previas aceleró el desarrollo y elevó en más de 10 pp el área en encañazón y espigazón. En el centro y sur del área agrícola el cereal mantiene condición Normal a Excelente, con lotes puntuales afectados por granizo. Se detectaron focos de mancha amarilla y roya, con controles puntuales. En el norte y parte del oeste, la falta de lluvias, de horas de frío y de radiación genera incertidumbre sobre los rindes.
Cebada 2026/27	98 % adec./ ópt.	Panorama hídrico favorable: el 98 % de los lotes implantados registra condición Adecuada u Óptima y el 96 % un estado general entre Normal y Bueno. El 68 % está en pleno macollaje y un 4 % inició encañazón. Los núcleos cebaderos del sur concentran el 73 % del área total, con la totalidad de los lotes en condición Normal o Buena y avance en la fertilización nitrogenada. La alta humedad relativa favoreció síntomas de mancha en red y otras enfermedades fúngicas, con aplicaciones preventivas y curativas puntuales.
Maíz 2026/27	1,5 %	Arrancó la siembra con destino grano comercial sobre las 8,4 MHa proyectadas. El mayor progreso se concentra en el Centro-Norte de Santa Fe, con 13 % de la superficie regional implantada. En el sudeste bonaerense la ventana recién se abre.
Maíz 2025/26	92,5 %	Cosecha en la recta final sobre el área apta, con rendimiento promedio de 77,8 qq/ha y proyección sostenida en 64 Mt. Las labores mantienen una demora de 6 pp respecto del ciclo anterior y los lotes pendientes se concentran en el sur del área agrícola.
Girasol 2026/27	19,3 %	Siembra sobre las 3 MHa proyectadas, con avance intersemanal de 2,6 pp y progresos dispares según región.

Fuente: Panorama Agrícola Semanal, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, relevamiento al 3/9/2026, accedido a través de síntesis periodística (Revista Chacra / Infobae, 3/9/2026). No se descargó el PDF original del PAS al cierre de esta edición.

SANIDAD: LA CONTRACARA DE LA HUMEDAD

TRIGO Y CEBADA

La ventana sanitaria

Las tres menciones sanitarias del PAS de esta semana - mancha amarilla y roya en trigo, mancha en red en cebada - comparten un mismo origen: humedad relativa alta sostenida. La secuencia de esta semana modifica el escenario en dos sentidos opuestos. El frío de estos días frena momentáneamente la tasa de infección, pero el ascenso térmico del miércoles y jueves, sobre un cultivo con humedad de suelo alta y rocío nocturno, recompone rápidamente las condiciones predisponentes. Si hay decisión de aplicar, esos dos días concentran a la vez la mejor condición de piso, la mejor temperatura para la eficacia del producto y el momento previo al repunte de la presión de enfermedad.

ESCENARIO ENSO Y PERSPECTIVA TRIMESTRAL

PRIMAVERA - VERANO

Estado del fenómeno

El sistema de alerta del Climate Prediction Center de la NOAA se mantiene en El Niño Advisory. La síntesis oficial indica que El Niño se está fortaleciendo, con más del 90 % de probabilidad de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte 2026-27 - es decir, nuestra primavera y verano -. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, el organismo asigna un 69 % de probabilidad de un evento histórico, que superaría en intensidad a todos los episodios registrados desde 1950, con un valor del índice RONI de +2,5 °C o más.

El propio CPC advierte que, con un evento de esa magnitud, las chances de observar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas. Es una probabilidad elevada sobre un patrón, no una certeza sobre un lote.

Fuente: NOAA / Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion; figuras actualizadas al 13/8/2026. La próxima discusión mensual se publica el jueves 10 de septiembre.

Pronóstico trimestral del SMN - SON 2026

El SMN publicó a fines de agosto su pronóstico climático de consenso para septiembre, octubre y noviembre. Para las precipitaciones, ubica en la categoría superior a lo normal al norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de Patagonia. Para el resto del territorio bonaerense la señal se reparte entre normal y superior a la normal, con probabilidades de entre 40 % y 50 % de superar los registros habituales en el sector sudoeste.

En temperatura, el organismo proyecta para la provincia de Buenos Aires mayor probabilidad de valores inferiores a los habituales durante el trimestre. La combinación no es contradictoria: mayor nubosidad y lluvia asociadas a El Niño moderan las máximas.

Fuente: Pronóstico Climático Trimestral SON 2026, Servicio Meteorológico Nacional, difundido el 30/8/2026.

Lo que esto significa para el centro y sudeste bonaerense

Un trimestre con lluvias entre normales y superiores y temperaturas por debajo de lo habitual describe, para un trigo que ya entra en llenado, un escenario de buena oferta hídrica con riesgo sanitario elevado y ventanas de piso más cortas. La restricción del ciclo probablemente no sea el agua. Serán la sanidad, la logística de aplicación y - como demuestra esta semana - la persistencia de heladas tardías sobre un cultivo que se adelantó fenológicamente.

GANADERÍA: EL CRIADOR ESTÁ RETENIENDO

MOVIMIENTOS Y REPRODUCTORES

Rosgan publicó un informe sobre movimientos de hacienda registrados por SENASA y precios de remates de julio y agosto, con dos lecturas relevantes para el productor bonaerense.

Indicador	2026 (8 meses)	Variación i.a.
Animales trasladados con destino a reproducción	≈ 530.000	+22 %
Hembras con destino reproductivo	≈ 460.000	+24 %
Participación de hembras jóvenes en esos movimientos	≈ 40 %	desde ≈ 50 %
Valor promedio del toro	≈ \$9,9 M	+59 % nominal
Toro medido en kilos de novillo	≈ 2.300 kg	+9 % real (desde 2.100)
Toro medido en kilos de ternero	≈ 1.600 kg	-3,5 % (desde 1.656)

Fuente: Rosgan sobre registros de SENASA y remates de julio-agosto de 2026, difundido el 4/9/2026. Precio promedio del ternero considerado: \$6.200/kg.

El volumen total con destino a reproducción es el más alto de los últimos cinco años y marca el tercer año consecutivo de aumento. Pero el dato fino está en la composición: la caída de la participación de terneras y vaquillonas del 50 % al 40 % es compatible con retención dentro del establecimiento, no con menor interés reproductivo. El criador está guardando sus futuras madres en lugar de volcarlas al mercado.

La consecuencia práctica: oferta de vientres restringida frente a demanda firme. Y una observación que suele pasarse por alto en la discusión de precios nominales: aunque el toro subió 59 % en pesos, el esfuerzo real de reposición medido en kilos de ternero cayó 3,5 %. Rosgan aclara que los datos de julio y agosto son preliminares y que las definiciones de la campaña se dan en septiembre y octubre.

MERCADOS

TRIGO Y MAÍZ

Precios en máximos

La semana cerró con los precios de los granos en el nivel más alto de la última década. El trigo tocó los USD 288 por tonelada en Chicago, un máximo de tres años, y fluctuó en torno a ese nivel sin superarlo. El maíz alcanzó los USD 214 por tonelada, también un máximo de tres años, impulsado en parte por el arrastre del trigo dada la competencia entre ambos como forrajeros. En el mercado local, los futuros de trigo 2026/27 en A3 alcanzaron máximos para la posición diciembre de 2026 y el pricing de mercadería respondió con firmeza.

El origen de la firmeza es geopolítico más que productivo: las demoras del cereal del Mar Negro para llegar a destino abrieron una ventana para el trigo argentino, cuyo line-up se ubica en máximos de cinco años para esta altura del año.

Fuente: Infobae Economía sobre datos de Chicago, A3 y Bolsa de Comercio de Rosario, 7/9/2026.

DECISIONES DE MANEJO - PRÓXIMOS 7 DÍAS

PRIORIZAR Y EJECUTAR

PRIORIDAD ALTA

Evaluar daño por helada en trigo, no antes de 72 horas

El daño por helada en encañazón y espigazón no se lee bien en las primeras 24 horas. Conviene recorrer los lotes entre miércoles y jueves, abrir tallos por encima del último nudo y observar el estado de la espiga en formación: si el tejido aparece acuoso, translúcido o pardo, hubo daño en el meristema y ese macollo no aportará rendimiento. Muestrear por ambiente, no por lote entero: las bajas topográficas y los lotes con rastrojo escaso concentran el daño. El registro de lo que se observe ahora es lo que permitirá decidir, más adelante, si conviene ajustar la refertilización.

PRIORIDAD ALTA

Aprovechar la ventana del miércoles 9 y jueves 10

Es el único tramo del período con piso, temperatura de trabajo y sin lluvia prevista. Concentrar allí las aplicaciones sanitarias pendientes en trigo y cebada, la fertilización nitrogenada que reste en los núcleos cebaderos y cualquier laboreo que requiera suelo firme. Desde el viernes las condiciones se deterioran y el fin de semana vuelve el frío.

PRIORIDAD MEDIA

No adelantar la siembra de maíz por calendario

La siembra nacional de maíz ya arrancó, pero el progreso se concentra en el Centro-Norte de Santa Fe. En el centro y sudeste bonaerense, con dos episodios de helada en una misma semana, el criterio sigue siendo la temperatura de suelo y no la fecha: esperar registros estables de al menos 12 °C a 5 cm de profundidad durante tres días consecutivos antes de implantar. La estimación oficial de área nacional es de 8,4 millones de hectáreas; no hay presión de calendario que justifique sembrar sobre suelo frío.

PRIORIDAD MEDIA

Cerrar la cosecha de maíz 2025/26 pendiente

Los lotes sin cosechar se concentran justamente en el sur del área agrícola, con una demora de 6 puntos porcentuales respecto del ciclo anterior. Los días secos del miércoles y jueves son también la mejor oportunidad de la semana para avanzar con esas labores antes del ingreso frío del fin de semana.

PRIORIDAD DE PLANIFICACIÓN

Reposición de reproductores

Si hay compra de toros prevista, septiembre y octubre concentran las definiciones de la campaña, con alrededor del 90 % de los movimientos en el segundo semestre. La señal de retención de hembras sugiere que la oferta de vientres podría tensionarse a medida que avance la temporada. Conviene evaluar la operación en kilos de producto y no en pesos nominales: es la única forma de ver que el esfuerzo real de reposición hoy es menor que el del año pasado.

INCERTIDUMBRE DECLARADA

QUÉ NO PUDO VERIFICARSE

Este boletín se compromete a decir qué no pudo verificar. Las lagunas de esta edición son las siguientes:

- 1 Pronóstico a 7 días. Los valores del cuadro provienen de un modelo global de pronóstico consultado el 7/9 a las 09:00 h. No se cotejaron contra el pronóstico oficial del SMN por localidad al cierre de esta edición. Ante discrepancia, prevalece el SMN. Las probabilidades de precipitación por debajo del 15 % deben leerse como "sin lluvia significativa esperada", no como certeza de tiempo seco.
- 2 Reservas de agua en el suelo (ORA). El sitio de la Oficina de Riesgo Agropecuario no respondió a la consulta automatizada de esta semana. No se dispone de los valores de balance hídrico superficial y profundo por partido para el cierre de esta edición. Las referencias hídricas del boletín provienen exclusivamente del relevamiento de condición de cultivo del PAS, que es una evaluación cualitativa a campo y no una estimación de agua útil.
- 3 Panorama Agrícola Semanal. Los datos del avance de campaña se tomaron de la síntesis periodística del informe del 3/9/2026, no del PDF original de la Bolsa de Cereales. Las cifras están verificadas contra la publicación, pero no contra la fuente primaria.
- 4 Emergencia y desastre agropecuario. La última normativa verificada es la Resolución 216/2026 del Ministerio de Economía, con vencimientos al 28/2 y al 30/4 de 2026. No se localizaron actualizaciones posteriores aplicables al ciclo 2026/27 para partidos del centro y sudeste. Quien esté tramitando certificados debe consultar directamente al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial.
- 5 Red de estaciones INTA. No se consultaron esta semana los registros de Balcarce, Barrow ni Cuenca del Salado. Las mínimas informadas para el episodio de helada son de modelo, no de estación.
- 6 ENOS. La discusión del CPC vigente al cierre tiene figuras actualizadas al 13/8/2026. La próxima actualización mensual se publica el jueves 10 de septiembre y podría modificar las probabilidades citadas.

Fuentes de esta edición: Servicio Meteorológico Nacional (alertas, pronóstico trimestral SON 2026, comunicación institucional del 4/9); Bolsa de Cereales de Buenos Aires (Panorama Agrícola Semanal al 3/9/2026); NOAA / Climate Prediction Center (ENSO Diagnostic Discussion, El Niño Advisory); Rosgan - Bolsa de Comercio de Rosario sobre registros de SENASA (informe del 4/9/2026); Meteored (anomalías térmicas); Infobae Economía y Revista Chacra (mercados y síntesis del PAS); Ministerio de Economía de la Nación (Resolución 216/2026). Fuentes de monitoreo permanente no consultadas o sin novedad esta semana: ORA, INTA Balcarce - Barrow - Cuenca del Salado, INA, Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, SISA, RENSPA, Bolsa de Comercio de Rosario (GEA), Infocampo, Windy.



El Viejo Viento - Agrometeorología para el productor. Boletín semanal de distribución gratuita. Alcance: provincia de Buenos Aires, con preponderancia en el centro y el sudeste bonaerense. Este boletín es una herramienta de interpretación agrometeorológica y no reemplaza al pronóstico diario ni al sistema oficial de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, que debe consultarse siempre ante situaciones de riesgo. Próxima edición: lunes 14 de septiembre de 2026.